

## Kenmerken

- Een primair gesloten chirurgische wond is een steriele wond met gladde wondranden
- Voor het sluiten van de wond kan gebruik worden gemaakt van hechtstrips, agraves, hechtingen of huidlijm
- Een secundair genezende chirurgische wond is een open wond. De wondranden wijken en het wondbed is zichtbaar

Bij wonden langer dan 3 weken open met weinig tot geen genezingstendens: stem af met huisarts en meld aan bij Verpleegkundige Topzorg [verpleegkundigetopzorg@umcg.nl](mailto:verpleegkundigetopzorg@umcg.nl) | [www.verpleegkundigetopzorg.nl](http://www.verpleegkundigetopzorg.nl)

## Anamnese

### *Aandacht voor:*

- Ontstaan, duur en beloop
- Beperkingen in mobiliteit
- Beperkingen in reageren op pijn
- Koorts
- Aard wond en locatie
- Diabetes mellitus, circulatiestoornissen, paresthesiën, voedingstoestand
- Huidafwijkingen

## Observatie / onderzoek

- Aspecten van de huid, wond en wond-omgeving
- Wondclassificatie volgens TIME (tissue/infection/moisture/edge) en zwart-geel-rood model (WCS)
- Preventie van wondinfectie
- Algeheel lichamelijk onderzoek

### *Mogelijke aanvulling:*

- Bloedonderzoek
- Wondkweek

## Resultaten

### *Wond is genezen:*

- Voorkom druk- en schuifkrachten op het operatiegebied

### *Redenen voor verwijzing:*

- Wondinfectie, necrose of dehiscentie: behandelend arts/chirurg
- Afwijkende, vertraagde of gestoorde wondgenezing: Verpleegkundige Topzorg

## Diagnose en beleid in overleg met (huis)arts

### Primair gesloten, niet lekkende wond

- Wondbedekker wordt 48 uur na de operatie verwijderd
- Bij verzadiging wondverband eerder vervangen en huid, wond en wondomgeving inspecteren volgens strikt aseptische werkwijze
- Gesloten, niet lekkende wond niet meer bedekken na 48 uur

### Primair gesloten, lekkende wond

- Wondvocht wordt opgevangen door wondbedekker
- Wondbedekker vervangen bij verzadiging
- Reinigen met gaas gedrenkt in lauwwarm kraanwater (vooraf kraan 30 sec. laten lopen) poetsen tot debris volledig is verwijderd<sup>1</sup>
- Bij verbandwissel inspectie op maceratie, ondermijning en dehiscentie
- Inspectie en verbinden volgens strikt aseptische werkwijze

### Secundair genezende wond

- Wondbedpreparatie en behandeling op geleide kleur, vochtigheid, conditie wondranden en exsudaat management
- Consulteer het wondteam voor advies wondzorg

1: Magson 2006, Gouveia 2007, van Gemeren 2009

Volgens richtlijn:

Wondzorg, 2013 NVvh en WIP postoperatieve wondinfecties 2011