

## Kenmerken

Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) ontstaan door overmatige blootstelling aan vocht, chemische en fysische irritatie welke de doorlaatbaarheid van de huid en de functie van de huidbarrière aantasten.

- Roodheid en oedeemvorming
- Locatie peri-anale regio of genitale huid
- In specifieke gevallen gaat IAD gepaard met blaren, erosie of een secundaire huidinfectie
- Bij schuiven: grillig ulcus, vaak met induratie en schubeffect
- Een gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkrachten

Bij wonden langer dan 3 weken open met weinig tot geen genezingstendens: stem af met huisarts en meld aan bij Verpleegkundige Topzorg [verpleegkundigetopzorg@umcg.nl](mailto:verpleegkundigetopzorg@umcg.nl) | [www.verpleegkundigetopzorg.nl](http://www.verpleegkundigetopzorg.nl)

## Anamnese

### *Aandacht voor:*

- Ontstaan, duur en beloop
- Incontinentie, transpiratie
- Lekkende wonden
- Zelfzorg

## Observatie en onderzoek

### *Aandacht voor:*

- Aspecten van de huid, wond en wondomgeving
- Locatie, kleur, vorm (kopieletsel), diepte, randen
- Infectieverschijnselen
- Combinatieletsel met druk- of schuifkrachten

*Mogelijke aanvulling: Wondkweek*

## Resultaten

### *Preventie:*

- Patiënt informeren
- Dagelijkse observatie van de huid bij hoog risico patiënt
- Huidplooien droog deppen, ook na wasdoekjes/oliedoekjes

### *Redenen voor verwijzing:*

- Na enkele dagen treedt geen verbetering op
- Afwijkende, vertraagde of gestoorde genezing van het huiddefect

# Diagnose en aanbevelingen i.o.m. (huis)arts

## Categorie 1 - Aanhoudende roodheid

### 1A: Aanhoudende roodheid zonder klinische tekenen van infectie

Essentieel Criterium

- **Aanhoudende roodheid**

Verschillende tinten roodheid kunnen aanwezig zijn. Bij patiënten met een donkere huidskleur, kan de huid bleker zijn dan normaal, donkerder zijn dan normaal of paars van kleur zijn

*Bijkomende criteria*

- Afgetekende zones met een verkleurde huid afkomstig van eerdere (reeds genezen) huidletsels
- Glimmende huid
- Verweekte huid (maceratie)
- Intacte blaasjes of blaren
- De huid kan gespannen of gezwollen aanvoelen bij palpatie

### 1B: Aanhoudende roodheid met klinische tekenen van infectie

Essentiële criteria: zie cat. 1A

- **Tekenen van infectie**

Zoals een witte schilfering van de huid (kan wijzen op een schimmelinfectie) of satelliet letsels (pustels rondom het letsel, kan wijzen op een Candida Albicans schimmelinfectie).

*Bijkomende criteria: zie cat. 1A*

## Categorie 2 - Ontvelling

### 2A: Ontvelling zonder klinische tekenen van infectie

Essentieel Criterium

- **Ontvelling**

Ontvelling kan zich manifesteren als erosie van de huid (kan het gevolg zijn van beschadigde/open blaasjes of blaren). De huidschade heeft een diffuus patroon.

*Bijkomende criteria*

- Aanhoudende roodheid. Verschillende tinten roodheid kunnen aanwezig zijn. Bij patiënten met een donkere huidskleur, kan de huid bleker zijn dan normaal, donkerder zijn dan normaal of paars van kleur zijn.
- Afgetekende zones met een verkleurde huid afkomstig van eerdere (reeds genezen) huidletsels
- Glimmende huid
- Verweekte huid (maceratie)
- Intacte blaasjes of blaren
- De huid kan gespannen of gezwollen aanvoelen bij palpatie
- Branderigheid, tintelingen, jeuk of pijn

### 2B - Aanhoudende roodheid met klinische tekenen van infectie

Essentiële criteria Ontvelling: zie cat. 2A

- **Tekenen van infectie**

Zoals een witte schilfering van de huid (kan wijzen op een schimmelinfectie) of satelliet letsels (pustels rondom het letsel, kan wijzen op een Candida Albicans schimmel(infectie), beslag aanwezig in het wondbed (geel/bruin/grijsig), groene verkleuring in het wondbed (kan wijzen op een bacteriële infectie met Pseudomonas aeruginosa), overmatig exsudaat, etterige afscheiding (pus) of een glanzend aspect van het wondbed.

*Bijkomende criteria: zie cat. 2A*